



معلومات عن التطعيم

اقرأ المعلومات أدناه بعناية قبل التوقيع على نموذج الموافقة. للمزيد قم بزيارة healthywa.wa.gov.au/immunisation

الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي (dTpa)

فيروس الورم الحليمي البشري (HPV)

ما هو
المرض؟

الدفتريا عبارة عن مرض بكتيري معدي يمكن أن يهدد الحياة ويسبب صعوبة شديدة في التنفس وفشل في القلب وتلف للأعصاب.

فيروس الورم الحليمي البشري HPV هو فيروس شائع يصيب الذكور والإناث، وهو شديد العدوى حيث أن أكثر من 90% من الأشخاص النشطين جنسياً يصابون بعدوى HPV في مرحلة ما من العمر. عادة ما يقوم الجسم بالتخلص من العدوى بشكل طبيعي وبدون أعراض مع معظم أنواع HPV، إلا أن هناك بعض الأنواع من فيروسات HPV تسبب ثآليل تناسلية، وبعضها يبقى في الجسم ويمكن بعد سنوات أن يسبب سرطانات في عنق الرحم والمناطق التناسلية (المهبل، والفرج، والقضيب، والشرج، والفم، والحلق).

التيتانوس عبارة عن مرض بكتيري شديد الخطورة يؤدي إلى الوفاة غالباً وهو يصيب الجهاز العصبي.

يعاني الأشخاص المصابون بالتيتانوس من تقلصات عضلية مؤلمة جداً مع تشنجات وانغلاق الفك. وقد تصيب هذه التقلصات كامل الجسم مما يتسبب في الإختناق وفشل عضلة القلب. تشير الإحصائيات إلى وفاة شخص واحد من كل 50 شخص يصابون بهذا المرض، رغم التقدم في الرعاية الصحية.

السعال الديكي عبارة عن مرض تنفسي شديد العدوى قد يتسبب في وفاة الرضع. نسبة وفاة الأطفال الذين يصابون بالمرض هي واحد لكل 125 طفلاً. المراهقون والبالغون الذين يتعرضون للمرض يعانون من أعراض تشبه البرد، وقد يصابون بالكحة الشديدة لمدة 3 أشهر.

كيف
ينتشر
المرض؟

الدفتريا عبارة عن بكتيريا تعيش في الفم، والأنف، والحلق، أو على جلد المصابين بها. يصاب الأشخاص بالدفتريا باستنشاقهم البكتيريا بسبب كحة أو عطس شخص مصاب. قد يصاب الأشخاص أيضاً بالدفتريا عند الإتصال بإفرازات من فم أو أنف أو حلق أو جلد شخص مصاب.

ينتشر فيروس HPV من خلال تلامس الجلد أثناء الإتصال الجنسي مع شخص حامل للفيروس، ونظراً لأن الفيروس لا يُرى بالعين المجردة، فيمكنه إختراق الجسم بسهولة في حالة وجود أي تشققات. لاينتشر المرض عن طريق الدم. الحماية التي يقدمها الواقي الذكري ضد فيروس HPV محدودة، لأنه لا يغطي المساحة الكلية للمنطقة التناسلية.

التيتانوس عبارة عن بكتيريا موجودة في التربة أو السماد. يمكن لهذه البكتيريا الدخول للجسم من خلال جرح صغير جداً في حجم شكة الدبوس. ولا يمكن لهذه البكتيريا الإنتقال من شخص لآخر.

السعال الديكي ينتشر بسهولة جداً عندما ينثر الشخص المصاب البكتيريا من خلال الكحة أو العطس في الهواء الذي يستنشقه المحيطون به. وفي حالة عدم تلقي العلاج يمكن للشخص الحامل للمرض أن ينقل العدوى للآخرين لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع بعد ظهور أعراض المرض الأولى.

فيروس الورم الحليمي البشري HPV

هل التطعيم آمن وفعال؟

نعم، ففي العقد الماضي تم إعطاء ما يزيد على 270 مليون جرعة على مستوى العالم. وهذا التطعيم مما يوصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو آمن ويمكن تحمله بسهولة. يعمل هذا التطعيم بكفاءة عند إعطائه في سن مبكر، حيث يكون رد الفعل المناعي للجسم في أوجه، كما أنه يكون أكثر فعالية عند إعطائه قبل بدأ أي نشاط جنسي. التطعيم ضد HPV فعال بنسبة 85-100% في الوقاية من الأنواع الرئيسية للفيروس التي تسبب السرطان والثآليل التناسلية، غير أن الإناث اللواتي يتلقين هذا التطعيم يحتاجن رغم ذلك إلى عمل فحوصات دورية للتأكد من خلوهن من سرطان عنق الرحم، لأن التطعيم لا يغطي كل أنواع فيروسات HPV. لقد تم إعطاء ملايين الأشخاص جرعات من هذا التطعيم على مستوى العالم، وهو آمن ومحتمل.

تتضمن هذه الجولة جرعتي تطعيم، ومن المهم أن يتلقى ابنك أو ابنتك في سن المراهقة كلتا الجرعتين للتأكد من حمايتهما من المرض بشكل كامل.

الأعراض الجانبية الشائعة

ألم - إحمرار - حكة - تورم صغير في مكان الحقن بالذراع.

لتخفيف الأعراض، ضع قطعة قماش رطبة وباردة على المنطقة المصابة.

الأعراض الجانبية الأقل شيوعاً

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة - إحساس بالإعياء - غثيان - صداع.

لتخفيف الأعراض، يمكن تناول مسكن Paracetamol حسب الإرشادات الموجودة على العبوة، مع شرب سوائل بكثرة. راجع الطبيب إذا استمرت الحرارة.

الأعراض الجانبية النادرة

يمكن حدوث رد فعل عنيف من قبل الجسم للتطعيم، لكنه نادر. من أمثلة ذلك تورم الوجه وصعوبة التنفس. كما هو الحال مع أي دواء، هناك احتمال ضعيف جداً لحدوث إصابات خطيرة أو وفاة من جرّاء تناول التطعيم.

إذا كان رد فعل الجسم عنيفاً أو استمرت الأعراض أطلب المساعدة الطبية فوراً أو إتصل بالمستشفى القريب منك.

ماهي الأعراض الجانبية المحتملة وكيفية التعامل معها؟

الدفتريا-التيتانوس-السعال الديكي (dTpa)

التطعيم ضد الثلاثي dTpa شديد الفعالية ضد الإصابة بالدفتيريا والتيتانوس، ونسبة فعاليته في الحماية من السعال الديكي تصل إلى 80%.

هذه الجرعة الإضافية من التطعيم ذات تركيز ضعيف خصوصاً بالنسبة لمكونات الدفتريا والسعال الديكي مقارنة بالتركيزات الخاصة بالصغار. الجرعات الإضافية من التطعيم آمنة ومحتملة.

الأعراض الجانبية الشائعة

ارتفاع متوسط في درجة الحرارة (أقل من 38 درجة مئوية) - إحساس بالإعياء - غثيان - صداع

لتخفيف الأعراض، يمكن تناول مسكن Paracetamol حسب الإرشادات الموجودة على العبوة، مع شرب سوائل بكثرة. راجع الطبيب إذا استمرت الحرارة.

ألم - إحمرار - حكة - تورم صغير في مكان الحقن بالذراع.

لتخفيف الأعراض، ضع قطعة قماش رطبة وباردة على المنطقة المصابة.

الأعراض الجانبية النادرة

التهاب العصب العضدي، مما يسبب ضعف وتخديّل.

يمكن حدوث رد فعل عنيف من قبل الجسم للتطعيم، لكنه نادر. من أمثلة ذلك تورم الوجه وصعوبة التنفس. كما هو الحال مع أي دواء، هناك احتمال ضعيف جداً لحدوث إصابات خطيرة أو وفاة من جرّاء تناول التطعيم.

إذا كان رد فعل الجسم عنيفاً أو استمرت الأعراض أطلب المساعدة الطبية فوراً أو إتصل بالمستشفى القريب منك.