



# 疫苗信息

在签署同意书之前，请仔细阅读以下信息。要了解更多信息，请访问 [healthywa.wa.gov.au/immunisation](http://healthywa.wa.gov.au/immunisation)

	人乳头瘤病毒(HPV)	白喉 - 破伤风 - 百日咳 (dTpa)
这是什么疾病?	<p><b>人乳头瘤病毒(HPV)</b>是影响男性和女性的常见病毒。HPV 是高度传染性的，高达 90% 的性活跃人群将在他们生命中的某个时刻感染 HPV。人体通常能自然地清除感染，而且多数 HPV 类型并没有症状。然而，某些类型的 HPV 可以引起生殖器疣，并且一些类型的病毒可以在体内持续多年，导致宫颈癌，阴部（阴道，外阴，阴茎），肛门和口腔与咽喉的癌症。</p>	<p><b>白喉</b>是一种具有传染性，可能危及生命的细菌感染，会导致严重的呼吸困难，心力衰竭和神经损伤。</p> <p><b>破伤风</b>是一种严重的，往往致命的影响神经系统的细菌疾病。破伤风患者会遭受严重的肌肉痉挛，惊厥和牙关紧闭症。这些痉挛可能影响全身，引起窒息和心力衰竭。即使有现代化重症监护，多达 50 分之一的破伤风患者会死亡。</p> <p><b>百日咳</b>是一种高度传染性呼吸道疾病，可能会危及婴儿的生命。每 125 名感染百日咳的六个月以下婴儿中，就有大约一人会死于肺炎或脑损伤。患有百日咳的青少年和成年人会出现类似感冒的症状，并可能会有多达三个月的严重咳嗽。</p>
该疾病如何传播?	<p><b>HPV</b> 是通过携带该病毒的人和他人发生生殖器皮肤与生殖器皮肤接触的性行为而传播的。HPV 病毒是微观的，因此可以透过皮肤上微小的破裂。它并不通过血液传播。避孕套只能提供有限的针对 HPV 的防护，因为它并不能覆盖生殖器上的所有皮肤。</p>	<p><b>白喉</b>杆菌可以滋生于感染者的口腔，鼻腔，咽喉或皮肤上。感染者咳嗽或打喷嚏后，人们可以通过将细菌吸入而感染白喉。人们还可以通过紧密接触感染者口腔，鼻子，喉咙或皮肤的分泌物而感染白喉。</p> <p><b>破伤风</b>是由土壤和粪便中发现的细菌引起的。细菌可以从小到如针刺般的伤口进入人体，但它不能从人传染到人。</p> <p>当感染者咳嗽或打喷嚏时，<b>百日咳</b>很容易传播到空气中，然后被附近的其他人吸入。如果不治疗，百日咳携带者可以在症状出现直至三周以内都可能感染他人。</p>

	人乳头瘤病毒(HPV)	白喉 - 破伤风 - 百日咳(dTpa)
<p><b>疫苗是安全有效的吗?</b></p>	<p>是的, 在过去的十年间, 全世界已经接种了超过 2.7 亿剂 HPV 疫苗, 世界卫生组织推荐这样做, 它安全且耐受。HPV 疫苗在年龄较小时接种效果最好, 因为免疫反应最强, 尤其在还未开始性行为之前接种效果最好。HPV 疫苗能够有效预防 85-100% 的导致癌症和生殖器疣的主要 HPV 感染类型。所有接种过 HPV 疫苗的女性仍然需要定期进行宫颈癌筛查, 因为疫苗并不包括每一种 HPV 类型。</p> <p>全世界已经接种过数百万剂的这种疫苗。这是安全的且耐受度良好。</p> <p>该疫苗须接种两次。您的处于青少年时期的孩子接种两次疫苗是至关重要的, 这能确保他们得到全面的保护。</p>	<p>dTpa 疫苗在预防白喉和破伤风方面非常有效, 预防百日咳有效性约为 80%。</p> <p>与儿童早期的疫苗相比, 这种加强疫苗的浓度更低, 尤其是白喉和百日咳的成分。该加强疫苗是安全的, 且耐受良好的。</p>
<p><b>有什么可能的副作用, 如果发生了怎么办?</b></p>	<p><b>常见副作用</b></p> <p>注射手臂处出现疼痛/发红/发痒/小肿块。如需缓解, 请于受影响位置敷凉爽的湿布</p> <p><b>非常见副作用</b></p> <p>低烧, 感觉不适, 恶心, 头痛。</p> <p>如需缓解, 可按照标签上的指示服用扑热息痛, 并补充更多水分。如果发烧持续, 请看你的家庭医生。</p> <p><b>极罕见副作用</b></p> <p>严重的反应是可能发生的, 但很少见, 例如面部肿胀或呼吸困难。与任何药物一样, 疫苗也有极小的概率会造成严重伤害或死亡。</p> <p>如果反应严重或持续, 请立即就医, 并联系当地医院。</p>	<p><b>常见副作用</b></p> <p>低烧 (低于 38° C)</p> <p>为了缓解症状, 请按照标签上的指示服用扑热息痛, 并补充更多水分。如果发烧持续, 请看您的家庭医生。</p> <p>注射手臂处出现疼痛/发红/发痒/小肿块。如需缓解, 请于受影响位置敷凉爽的湿布。</p> <p><b>极罕见副作用</b></p> <p>臂丛神经炎 (手臂神经发炎, 导致无力或麻木)。</p> <p>严重的反应是可能发生的, 但很少见, 例如面部肿胀或呼吸困难。与任何药物一样, 疫苗也有极小的概率会造成严重伤害或死亡。</p> <p>如果反应严重或持续, 请立即就医, 并联系当地医院。</p>

Produced by the Communicable Disease Control Directorate  
 © Department of Health 2019

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the *Copyright Act 1968*, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of the State of Western Australia.