



ซิฟิลิส

ในขณะที่เราพยายามจะทำให้เอกสารนี้มีข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ข้อมูลเหล่านี้ก็ไม่สามารถใช้ทดแทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้ กรุณาไปพบผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ หากคุณมีความกังวลใด ๆ เกี่ยวกับสุขภาพของคุณ รายการที่แสดงอยู่ด้านล่างของเอกสารนี้ เป็นรายชื่อของสถานที่ที่คุณจะสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้

ซิฟิลิสคืออะไร?

ซิฟิลิส เป็นโรคที่ร้ายแรงมากโรคหนึ่ง ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อสมองและอวัยวะอื่นๆ ของคุณ โรคนี้เกิดจากแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า *Treponema pallidum* ซิฟิลิสเป็นโรคที่รักษาได้ง่าย หากพบเสียแต่เนิ่นๆ

คุณจะติดเชื้อซิฟิลิสได้อย่างไร?

ซิฟิลิสเป็นโรคที่แพร่กระจายโดยการมีเพศสัมพันธ์แบบไม่มีการป้องกัน ทางช่องคลอด ทางปาก หรือทางทวารหนัก โรคนี้ยังอาจแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิด หรือจากผิวหนังสู่ผิวหนังของผู้ติดเชื้อได้อีกด้วย
คุณแม่ที่ติดเชื้อ สามารถแพร่กระจายเชื้อซิฟิลิสไปสู่ทารกของเธอ ผ่านทางรกในขณะตั้งครรภ์ได้

สัญญาณหรืออาการของซิฟิลิสคืออะไร?

- สัญญาณแรกของซิฟิลิสจะคงอยู่ได้ไม่นาน ดังนั้น คุณสามารถติดเชื้อ และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้โดยไม่รู้ตัว
- บางคนเป็นแผลหรือแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ หรือปาก เป็นเวลา 3 ถึง 12 สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อ อาการที่เจ็บแสบนี้ อาจมีขนาดหรือเป็นรูปร่างขึ้นมา ก็ได้ แต่มักจะไม่เจ็บปวด ไม่ตกเลือด และรู้สึกเหมือนมีปมแข็งๆ บนผิวหนัง
- หากไม่ได้รับการรักษา อาการเจ็บแสบก็จะบรรเทา และหายไปในเวลาไม่กี่สัปดาห์ แต่คุณยังคงติดเชื้ออยู่ และแบคทีเรียยังอยู่ในกระแสเลือด และจะแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย (ระยะที่หนึ่ง)
- ประมาณสอง ถึง 6 เดือนหลังจากการติดเชื้อ คุณอาจมีอาการผื่นขึ้นที่ผิวหนัง บนใบหน้า ฝ่ามือ และฝ่าเท้า มีอาการบวมของต่อมต่างๆ เป็นก้อนรอบพื้นที่อับชื้นของร่างกาย และผมร่วง คุณยังอาจมีอาการปวดหัว และปวดในกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่ออีกด้วย นี่คือนะยะที่สอง ซึ่งอาจกินระยะเวลา 6 เดือน หรือมากกว่านั้น
- หากไม่ได้รับการรักษา จะมีระยะเชื้อหลบใน (Latent Stage) โดยที่ไม่แสดงสัญญาณใดๆ ให้เห็นเลย แต่ผู้ติดเชื้อก็ยังคงมีเชื้ออยู่ และสามารถแพร่กระจายเชื้อซิฟิลิสผ่านการร่วมเพศได้ถึง 2 ปี หากคุณติดเชื้อซิฟิลิสโดยที่ไม่ได้รับการรักษามานานกว่า 2 ปี (ระยะที่สาม) โรคนี้จะมีผลต่อสมอง หัวใจ เส้นเลือดใหญ่ กระดูกสันหลัง ผิวหนัง และกระดูก ซึ่งจะนำไปสู่ความพิการ และเสียชีวิตในที่สุด



ซิฟิลิส

- หากสตรีมีครรภ์ติดเชื้อซิฟิลิส ลูกน้อยอาจคลอดมาแล้วเสียชีวิต หรือพิการ (ซิฟิลิสแต่กำเนิด) หากพบเสียแต่เนิ่นๆ ในช่วงการตั้งครรภ์ ซิฟิลิสสามารถรักษาได้ และยังลดอันตรายที่จะเกิดกับทารกน้อย ผู้หญิงทุกคน ควรตรวจหาเชื้อซิฟิลิสใน 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ หรือในการนัดครั้งแรกของการไปฝากครรภ์

ผม/ดิฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าติดเชื้อซิฟิลิส?

แพทย์ของคุณ จะทำการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อซิฟิลิส อย่างไรก็ตาม สำหรับช่วงเวลาสั้นๆ หลังจากที่เชื้อซิฟิลิสเข้าสู่ร่างกายนั้น จะไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยการตรวจเลือด ดังนั้น แม้ผลตรวจของคุณจะเป็นลบ คุณยังคงจะต้องทำการตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจากนั้น ไปแล้ว 3 เดือน

จะเป็นการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ กามโรค (STIs) อื่น ๆ เช่น หนองในเทียม และ HIV ในเวลาเดียวกันไปด้วย หากตรวจพบว่า คุณติดเชื้อซิฟิลิส คู่นอนของคุณทุกคนก็จำเป็นต้องเข้ารับ การตรวจด้วย การตรวจสอบนี้ จะกระทำอย่างรอบคอบ โดยให้ความเคารพในความลับ ของทุกๆ คน (ความเป็นส่วนตัว)

ผม/ดิฉันจะต้องทำอะไรบ้าง หากติดเชื้อซิฟิลิส?

ไปพบแพทย์ของคุณ (GP) หรือแพทย์ที่คุณเลือกโดยเร็วที่สุด หาก你认为ว่าคุณอาจติดเชื้อซิฟิลิส เมื่อได้รับการยืนยันการวินิจฉัยโรคแล้ว คุณจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับใครอีก แม้จะใช้ถุงยางอนามัยด้วยก็ตาม จนกระทั่งคุณได้เสร็จสิ้น การบำบัดชนิดเต็มรูปแบบแล้ว ซิฟิลิสนั้นติดต่อได้ง่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระยะที่หนึ่งและระยะที่สอง

จะเป็นการดี หากจะมีการตรวจสอบการติดเชื้อกามโรคอื่น ๆ เช่น หนองในเทียม หนองใน และ HIV ในเวลาเดียวกันไปด้วย หากตรวจพบว่า คุณติดเชื้อซิฟิลิส คู่นอนของคุณทุกคนก็จำเป็นต้องเข้ารับ การตรวจด้วย การตรวจสอบนี้ จะกระทำอย่างรอบคอบ โดยให้ความเคารพในความลับของทุกๆ คน

ผม/ดิฉันจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้าง?

ซิฟิลิส ต้องรักษาด้วยยาเพนิซิลลิน หรือยาปฏิชีวนะอื่นๆ คุณจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา ชนิดเต็มรูปแบบ และจะต้องไม่พลาดการนัดหมายของแพทย์ด้วย หลังจากการบำบัดแล้ว คุณจำเป็นต้องทำการตรวจเลือดอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจได้ว่า คุณหายขาดแล้ว



ซิฟิลิส

ผม/ดิฉันจะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อซิฟิลิสได้อย่างไร?

วิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อซิฟิลิส และกามโรคประเภทอื่นๆ คือ

- ควรหมั่นใช้ถุงยางอนามัย แผ่นยางอนามัยสำหรับเลีย และสารหล่อลื่นที่ทำจากน้ำ อยู่เสมอ ถุงยางอนามัยและแผ่นยางอนามัยสำหรับเลีย เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะปกป้องคุณทั้งสองจากการติดเชื้อซิฟิลิส และกามโรคประเภทอื่นๆ ควรหมั่นใช้ถุงยางอนามัย และแผ่นยางอนามัยสำหรับเลีย จนกว่าคุณจะแน่ใจว่าทั้งคุณและคู่นอนของคุณนั้นไม่เป็นกามโรค
- มีความสัมพันธ์ระยะยาว ซึ่งคุณทั้งสองไม่เคยมีใครติดเชื้อมาก่อน และคุณทั้งสองไม่มีคู่นอนคนอื่นๆ
- จำกัดจำนวนคู่นอนของคุณ ยิ่งจำนวนคนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยน้อยลงเท่าใด โอกาสที่จะมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ติดเชื้อซิฟิลิสก็น้อยลงเท่านั้น
- หมั่นตรวจร่างกายเพื่อตรวจหาเชื้อกามโรคเป็นประจำ

การสนทนาเกี่ยวกับกามโรคอาจเป็นเรื่องยาก แต่คนที่คุณมีเพศสัมพันธ์ด้วยก็มีสิทธิที่จะรับทราบเช่นกัน หากคุณเป็นกามโรค ให้เริ่มสนทนาเมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายและมั่นใจ ไม่ใช่แค่ก่อนเวลาที่คุณจะเริ่มมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น คู่นอนของคุณจะประทับใจกับความซื่อสัตย์ของคุณ และการที่คุณไม่ต้องการที่จะแพร่เชื้อให้เขา/เธอ คุณเองก็มีสิทธิที่จะทราบเช่นกันว่า พวกเขาติดเชื้อด้วยหรือไม่

ผม/ดิฉันจะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิฟิลิสได้จากที่ใดบ้าง?

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

- แพทย์ของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่นๆที่ท่านเลือก
- เฮลท์ไดเรกต์ ออสเตรเลีย (**healthdirect Australia**)
☎ 1800 022 222
- **Sexual Health Helpline**
☎ 9227 6178 (สำหรับผู้ที่โทรจากเขตเมือง) หรือ
☎ 1800 198 205 (สำหรับผู้ที่โทรจากเขตภูมิภาค – โทรฟรีเฉพาะเมื่อใช้โทรศัพท์บ้าน)

เอกสารฉบับนี้สามารถจัดทำขึ้นในรูปแบบอื่น ๆ ได้ถ้ามีการขอเพื่อนำไปให้ผู้ที่เป็นบุคคลทุพพลภาพ